



ZDRAV VID ZA BEZBRIZNO ODRASTANJE

Nova epoha u oftalmologiji, sa inovativni mogućnostima korekcije vida, odavno je otpočela, sa ciljem da se smanji slabovidost kod djece i spriječi sljepilo, poručuju iz Specijalne bolnice Sveti Vid



Piše: Dr Marina Dragović,
medicinski direktor
Specijalne bolnice SVETI VID



Reagujte na vrijeme!

Borba za popravljivanje vida djeteta počinje od prvih dana, a traje sve do navršene sedme-osme godine, stvaranjem potencijala za cijeli život. Ukoliko u ovom uzrastu postoji problem koji remeti razvoj vida (katarakta, glaukom, nekorigovana dioptrija, strabizam), a koji se odlaže za kasnije, efekat zakasnele hirurgije biće mnogo manji. To je stav savremene oftalmologije u vodećim pedijatrijskim oftalmološkim ustanovama širom svijeta. No, čini se da, i pored tih savremenih stavova i iskustava širom svijeta, jedna vrata ipak dugo ostaju zatvorena pred ovom činjenicom. Šta to znači? Nesigurnost i nepoznavanje problema u cjelini stvara konfuziju, u kojoj se sve odlaže, ili za period kad dijete odraste, ili kad katarakta sazri. Zatvaraju se oči pred činjenicom da će se iz toga izroditi trajna slabovidost ili sljepilo. Rukovodeći se stavom da se moramo boriti za bolji funkcionalni vid, moramo stvoriti uslove u kojima će se on i razvijati. I intervenisati – odmah.

Operacija strabizma

U praksi se najčešće susrećemo sa odlaganjem operacije strabizma (razrokosti). Osnovno je odmah uočiti prve anomalije i isključiti neurološke razloge. Cilj je da se oči postave u adekvatan položaj – kako bi slika koju dijete dobija sazrijevanjem vida bila kvalitetnija. Odlaganje stvara patološke uslove u kojima se ne uspostavljaju normalni refleksi, već ostaje slabovidost ili dupla slika. Naravno, operaciji strabizma ne treba pristupati strogo mehanički. Svaki uzrast ima i svoja fiziološka pravila i smjernice. A često se susrećemo i


sa zahtjevima za ispravljanjem neadekvatnih hirurških postupaka. Nakon njih ostaje ožiljačno tkivo, što otežava rad hirurga. Takođe, to daje i nepredvidivost funkcijskih odgovora.

Laserske procedure

Jasno su definisane situacije (indikacije) kada se laser mora primijeniti.

1. Dioptrijski problem (refraktivne mane), kratkovidost, dalekovidost, astigmatizam, koji se u potpunosti ne koriguju naočalama ili kontaktnim sočivima. Najčešće u slučaju razlike u dioptriji (anizometropija), kao i visoke dioptrije. Nepotpuna korekcija dovešće do slabovidosti i skretanja oka (razrokosti). Ovakav strabizam, nastao sekundarno zbog nekorigovane dioptrije, ne rješava se operacijom, već laserskom korekcijom dioptrije. Oko dolazi u pravilan položaj tek s punom korekcijom i tek tada ima smisla zatvarati bolje oko naizmjenično te tako vježbati ono slabije. Operacija strabizma će možda biti neophodna i nakon ovih koraka, radi uklanjanja zaostalog ugla razrokosti.

2. Akomodativni strabizam – skretanje oka zbog velike akomodacije. Ovaj problem nastaje usljed nekorigovane dioptrije, najčešće hipermetropije (dalekovidosti). Adekvatnom korekcijom dioptrije oko se oslobađa akomodativnog napora, te dolazi u pravilan položaj. To se može postići pomoću naočala (dioptrija na oba oka približno ista), ali po njihovom skidanju oko ponovo skreće. To je posebno veliki problem kod mališana koji se bave fizičkim aktivnostima, kad nošenje naočala predstavlja opterećenje. Laserska korekcija



daje komforne uslove, a njome se otklanja uslov za skretanje oka i postiže se oštar vid.

3. Kod djece s posebnim potrebama (ccerebralna paraliza, različiti sindromi, neuromuskularna oštećenja) nema uslova za prihvatanje korekcije naočalama ili kontaktnim sočivom. Laserskom korekcijom stvaraju se preduslovi neophodni za bolju adaptaciju u okruženju. Na taj način obezbijediće im se oštriji vid, ali se time ne zaustavlja mogućnost dalje promjene dioptrije. Važno je da se u datom momentu, ključnom za razvoj vida (do polaska u školu), stvore optimalni uslovi – dobra korekcija dioptrije. Ukoliko dijete pomoću naočala postiže dobru vidnu oštrinu, laser ne mora biti opcija. Ukoliko odbija korekciju, ili se ona ne postigne na konvencionalan način, on je jedino rješenje. U školskom uzrastu, kada je oštrina vida već formirana, lako se dodaju – ukoliko je neophodno – naočale koje će korigovati eventualnu novonastalu dioptriju. Odlaganje laserske korekcije na stariji uzrast, kad je slabovidost već "ukorijenjena", imaće više estetski nego funkcionalni efekat (dioptrija se skida, ali se ne ispravlja vidna oštrina). Tada laser može biti opcija po želji i izboru.

TEKST: PR FOTO: PR